

- Behandel de oorzaak**
- Bepaal het doel van de wondbehandeling
- Informeer en betrek de patiënt bij de wondbehandeling
- Leg de afgesproken wondbehandeling vast in het zorgplan
- Evalueer de wondgenezing ten minste wekelijks, rapporteer de bevindingen
- Het gekozen wondverband moet contact maken met de wondbodem
- Houd het eenvoudig, vermijd combinaties
- Zorg voor een zo schoon mogelijk werkveld (alcohol 70%)
- Neem de algemene infectiepreventiemaatregelen in acht (bijv. handhygiëne, ringen)
- Kies voor afmetingen conform de gebruiksaanwijzing
- Indien de wondgenezing stagneert of zelfs achteruitgaat meld dit aan de behandelaar, verwijst patiënt na 3 wkn.
- Preventie denk aan voeding, medicatie, beweging en roken

Nb: terughoudendheid gewenst bij het toepassen van antibiotica, uitsluitend geïndiceerd indien de infectie zich uitbreidt en een systemisch karakter krijgt

probleem	etiologie	actie
decubitus	druk / schuifkrachten	reduceren druk en/of schuifkrachten
veneuze insufficiëntie	veneuze hypertensie	analyse veneus ambulante compressie therapie (ACT)
arteriële insufficiëntie	ischemie	analyse arterieel revascularisatie
diabetisch ulcus	druk/ischemie, neuropathie	analyse arterieel off-loading, bloedsuikerregulatie
Incontinence Associated Dermatitis (IAD)	urine- en/ of fecale incontinentie	aandacht voor frequentie en soort incontinentiemateriaal

NOVEMBER 2011



Wondprotocol volgens TIME

Tissue Weefsel	Infection infectie	Moisture vochtbalans	Edge / wondranden Doel = beschermen barrièrespray barrièrecreme zinkolie productkeuze/generiek/actie
necrose en/of fibrine doel = verwijderen	nee	droog	droog houden* chirurgisch debridement hydrogel enzymatische necroseoplosser
	ja	vochtig/nat droog	chirurgisch debridement EUSOL paraffine** enzymatische necroseoplosser alginaat Ag hydrofiber Ag
fibrine doel = verwijderen/ reinigen	nee	vochtig/nat	chirurgisch debridement alginaat
	ja	vochtig/nat	lipido-colloïd hydrogel
granulatie doel = beschermen	nee	vochtig/nat	alginaat hydrofiber schuimverband lipido-colloïd
	ja	vochtig/nat	alginaat Ag hydrofiber Ag schuimverband Ag lipido-colloïd SSD

* geldt alleen voor necrose: in overleg met arts of wondconsulent

** voorschrift alleen in overleg met arts of wondconsulent



Exsudaatniveau



Knippen kan



Secundair verband nodig



Fixatie nodig



Antimicrobieel

Productinformatie

- barrièrespray/ barrièrecreme
- enzymatische necrose oplosser
- EUSOL paraffine
- negatieve druktherapie**

Alginaat



Alginaat AG



Hydrogel



Hydrofiber



Hydrofiber AG



Lipido-colloïd



Lipido-colloïd SSD



Schuimverband



Schuimverband AG



Producten VieCuri

alginaat	Melgisorb
alginaat Ag	Melgisorb Ag
hydrogel	Normlgel
hydrofiber	Aquacel
hydrofiber Ag	
lipido-colloïd	Urgotulle
lipido-colloïd SSD	Urgotulle SSD
schuimverband	Mepilex Mepilex border
schuimverband Ag	Mepilex Ag
enzymatische necroseoplosser	Novuxol
wondrandbeschermer	Cavilon spray zinkolie
negatieve druktherapie	VAC therapie